

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ* ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ§

ΕΜΒΟΛΙΟ	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
Ηπατίτιδας Β	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου 	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό Νεογνό με βάρος <2000 g (Βλέπε επεξηγήσεις ΕΠΕ)
Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη (DTaP) Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη τύπου ενηλίκου (Tdap) Διφθερίτιδας- Τετάνου (DT, Td)	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου)σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου Για τα εμβόλια που περιέχουν αντιγόνα κοκκύτη: εγκεφαλοπάθεια (κώμα, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, παρατεταμένοι σπασμοί) μη αποδιδόμενο σε άλλη αιτία, εντός 7 ημερών από τον εμβολιασμό 	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό Σύνδρομο Guillain-Barré (GBS) εντός 6 εβδομάδων από εμβολιασμό με σκεύασμα που περιέχει τοξοειδές του τετάνου Ιστορικό αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου Arthus μετά από χορήγηση εμβολίου που περιέχει τοξοειδές τετάνου ή διφθερίτιδας. Αναβολή εμβολιασμού με παρόμοιο σκεύασμα έως και 10 έτη από την τελευταία δόση Για τα εμβόλια που περιέχουν αντιγόνα κοκκύτη: εξελισσόμενο ή ασταθές νευρολογικό νόσημα (περιλαμβανομένων και των βρεφικών σπασμών), μη ελεγχόμενοι σπασμοί ή εξελισσόμενη εγκεφαλοπάθεια μέχρι την αντιμετώπιση ή σταθεροποίηση της κατάστασης <p>Μόνο για το DTaP ή DTP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Θερμοκρασία > 40.5° C εντός 48 ωρών από τον εμβολιασμό με DTP ή DTaP Επεισόδιο απώλειας συνείδησης εντός 48 ωραπό τον εμβολιασμό με DTP ή DTaP Σπασμοί εντός 3 ημερών από τον εμβολιασμό με DTP ή DTaP Επίμονο, απαρηγόρητο κλάμα διάρκειας ≥ 3 ωρών εντός 48 ωρών από τον εμβολιασμό με DTP ή DTaP

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ* ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ§

ΕΜΒΟΛΙΟ	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
Έναντι ροταϊού	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου • Σοβαρή μικτή ανοσοανεπάρκεια (SCID) • Ιστορικό εγκολεασμού 	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό • Ανοσοανεπάρκεια εκτός SCID • Χρόνια γαστρεντερική νόσος • Δισχιδής ράχη ή εκτροφή κύστεως
Αιμοφίλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib)	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου • Βρέφη, ηλικίας <6 εβδομάδων 	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό
Αδρανοποιημένο έναντι πολιομυελίτιδας (IPV)	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου 	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό • Κύηση
Πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο ή πολυσακχαριδικό (PCV ή PPSV23)	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (πχ αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου (για το PCV13 περιλαμβάνεται και η αλλεργία σε άλλο εμβόλιο που περιέχει τοξοειδές διφθερίτιδας) 	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ* ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ§

ΕΜΒΟΛΙΟ	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
Ιλαράς –Παρωτίτιδας- Ερυθράς	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (πχ αναφυλαξία) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου • Κύηση • Σοβαρή ανοσοανεπάρκεια (αιματολογικοί ή συμπαγείς όγκοι, χημειοθεραπεία, συγγενής ανοσοανεπάρκεια, μακράς διάρκειας ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή ασθενείς με HIV και σοβαρή ανοσοκαταστολή) 	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό • Πρόσφατη λήψη, εντός 11 μηνών, αντισωμάτων που περιέχονται σε παράγωγα αίματος (το ακριβές χρονικό διάστημα εξαρτάται από το προϊόν) • Ιστορικό θρομβοπενίας ή θρομβοπενικής πορφύρας • Διενέργεια φυματινοαντίδρασης (Mantoux). Εφόσον δεν γίνει ταυτόχρονα με το εμβόλιο, συστήνεται μετά την παρέλευση 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό
Ανεμευλογιάς	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου • Κύηση • Σοβαρή ανοσοανεπάρκεια (αιματολογικοί ή συμπαγείς όγκοι, χημειοθεραπεία, συγγενής ανοσοανεπάρκεια, μακράς διάρκειας ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή ασθενείς με HIV και σοβαρή ανοσοκαταστολή) 	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό • Πρόσφατη χορήγηση, εντός 11 μηνών, αντισωμάτων που περιέχονται σε παράγωγα αίματος (το ακριβές χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από το προϊόν) • Χορήγηση αντιικών φαρμάκων (acyclovir, famciclovir, valacyclovir) \leq 24 ώρες πριν τον εμβολιασμό. Αποφυγή χορήγησης των παραπάνω αντιικών για διάστημα 14 ημερών από τον εμβολιασμό
Ηπατίτιδας Α	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου 	<ul style="list-style-type: none"> • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ* ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ§

ΕΜΒΟΛΙΟ	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
Αδρανοποιημένο έναντι γρίπης	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου 	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό Ιστορικό GBS εντός διαστήματος 6 εβδομάδων από προηγούμενο αντιγριπικό εμβολιασμό Σε ιστορικό αναφυλαξίας ή κνίδωσης μετά έκθεση σε πρωτεΐνη του αυγού, ο εμβολιασμός μπορεί να διενεργηθεί σε περιβάλλον με κατάλληλο εξοπλισμό και γνώσεις αντιμετώπισης. Συστήνεται η παρακολούθηση του ασθενή για χρονικό διάστημα $\geq 30'$ από τον εμβολιασμό
Έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου 	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό Κύηση
Έναντι μηνιγγιτιδοκόκκου συζευγμένο ή πολυσακχαριδικό	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου 	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό
Έναντι έρπητα ζωστήρα	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου Κύηση Σοβαρή ανοσοανεπάρκεια (αιματολογικοί ή συμπαγείς όγκοι, χημειοθεραπεία, συγγενής ανοσοανεπάρκεια, μακράς διάρκειας ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή ασθενείς με HIV και σοβαρή ανοσοκαταστολή) 	<ul style="list-style-type: none"> Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό Χορήγηση αντιικών φαρμάκων (acyclovir, famciclovir, valacyclovir) ≤ 24 ώρες πριν τον εμβολιασμό. Αποφυγή χορήγησης των παραπάνω αντιικών για διάστημα 14 ημερών από τον εμβολιασμό

***Απόλυτη αντένδειξη:** η κατάσταση κατά την οποία ο εμβολιαζόμενος έχει σημαντική πιθανότητα σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας. **Σχετική αντένδειξη:** η κατάσταση κατά την οποία ο εμβολιαζόμενος πιθανόν διατρέχει αυξημένο κίνδυνο σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας ή ο εμβολιασμός δυνατόν να οδηγήσει σε μειωμένη ανοσολογική απάντηση, § Για αλλεργία στο latex, συμβουλευθείτε το αντίστοιχο φύλλο οδηγιών του προϊόντος